

โรคพิษสุนัขบ้า



- เป็นโรคติดต่อที่ติดจากสัตว์สู่คน
- สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดสามารถติดเชื้อได้ (ได้แก่ สุนัข แมว ค้างคาว และสัตว์ป่าอีกหลายชนิด)
- เมื่อมีอาการทางระบบประสาทแล้วจะไม่สามารถรักษาให้หายได้

อาการของโรค



• ในสัตว์

ระยะเริ่มแรก

- นิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม ไม่ร่าเริง เก็บตัวหวาดระแวง

ระยะตื่นเต้น

- มีอาการทางระบบประสาท อยู่ไม่นิ่ง กัดข้าวของ กัดไม่เลือก ม่านตาขยาย

ระยะอัมพาต

- น้ำลายไหล คางห้อยตก ล้มลงและตาย



• ในคน

ระยะฟักตัว

- 3-6 สัปดาห์ ในบางรายอาจมีระยะฟักตัวสั้น ไม่เกิน 1 สัปดาห์ หรืออาจจะมากถึง 1 ปี

อาการ

- เบื่ออาหาร เจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย คั่นแผลรุนแรง กระสับกระส่าย เพ้อเจ้อ กลัวแสง กลัวลม กลัวน้ำ กลืนลำบาก แขนงหน้าอก ชักเกร็ง เป็นอัมพาต และเสียชีวิตในที่สุด



ขั้นตอนการป้องกันการติดเชื้อ



พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน
ป้องกันเชื้อพิษสุนัขบ้า



หลีกเลี่ยง
ไม่ให้สัตว์กัด/ทำร้าย



เมื่อโดนกัดให้รีบล้างทำความสะอาด
ด้วยสบู่ 2-3 ครั้ง แล้วรีบไปพบแพทย์
ทันที เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า